



Nuevo polluelo

Instrucciones de cuidado



ATENCIÓN: INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA UN MANEJO SEGURO

Las aves de corral vivas (polluelos, pollos, patitos, patos, gansos, aves de guinea y pavos) pueden propagar los gérmenes de la salmonela incluso si se ven saludables y limpios. Cuando se transmiten a las personas, estos gérmenes pueden provocar una enfermedad leve o grave y potencialmente mortal para ciertas personas. Estos son algunos consejos simples para ayudarlo a protegerse a usted mismo y a su familia:

- Siempre lávese las manos con agua y jabón inmediatamente después de tocar aves de corral, sus huevos o cualquier elemento en el área donde viven y deambulan.
- Los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 años y las personas con sistemas inmunitarios debilitados no deben manipular ni tocar pollitos,

patitos u otras aves de corral. Es más probable que se enfermen por gérmenes como la salmonela.

- No acurruque ni bese aves de corral porque los gérmenes podrían entrar en su boca y hacer que usted se enferme.
- No permita que las aves vivas entren en áreas de circulación humana, especialmente en baños y áreas donde se preparan, sirven o almacenan alimentos o bebidas.

Para obtener más consejos e información sobre la manipulación segura, visite <https://www.cdc.gov/backyardpoultry> o llame al 1-800-CDC-INFO.



Suministros

Cuando recoja sus nuevos pollitos, asegúrese de obtener todos los suministros que necesitará.

Llevarlos a casa implica obtener suministros

- | | |
|--|---|
| ☐ Gallinero | ☐ Bebedero |
| ☐ Virutas | ☐ Comedero |
| ☐ Alimentación inicial/de engorde | ☐ Termómetro |
| ☐ Grano triturado | ☐ Incubadora |
| ☐ Probióticos y electrolitos | ☐ Lámpara y bombilla para incubadora |

Entrega y recogida

Mantener a los pollitos en la caja y colocarlos en el piso para que no se tumben si el vehículo se detiene repentinamente. Si hace frío afuera, mantenga el calentador encendido dentro del vehículo. Si hace calor afuera, no deje a los pollitos encerrados en un automóvil. Los pollitos están disponibles para la compra en línea. Los pedidos se despacharán de lunes a miércoles, todas las semanas. Los huevos se envían a través del Servicio Postal de los Estados Unidos (U.S. Postal Service, USPS) a su oficina local de correo para su recogida. Recibirá una llamada al número de teléfono que proporcione cuando realice su pedido. Deben recogerse dentro de las 24 horas.

Una vez en casa

Designe un área de incubación en un garaje u otro espacio al aire libre protegido. Para criar pollitos o patitos, use una estructura sólida con paredes de al menos 18 pulgadas de alto y coloque la caja en un área segura lejos de corrientes de aire y mascotas domésticas. Use una pantalla para cubrir la estructura. Si la cantidad de animales es mayor, se puede utilizar un tanque de material metálico en un edificio externo cerrado y sin corrientes de aire. No utilice una caja de cartón o un contenedor de plástico como zona de incubación. La lámpara para incubación puede derretir el plástico y caerse en las virutas de pino o prender fuego la caja de cartón. Los pollitos necesitan medio pie cuadrado de espacio por ave durante las primeras dos semanas. Crecen rápidamente, por lo que deberá expandir el área a medida que crecen. Después de dos semanas, aumente el espacio a un pie cuadrado por ave.

Lecho

Disponga un lecho que pueda contener y absorber excrementos de pollitos y cámbielo diariamente. Esto también evita que la superficie sea demasiado resbaladiza para los pollitos. Sin una base adecuada, sus patas no se desarrollarán correctamente y tenderán a inclinarse. Es recomendable tener de 2 a 3 pulgadas de hojarasca, generalmente virutas de pino. Si la caja de incubación tiene un piso de metal, es recomendable colocar primero toallas de papel para darles a los pollitos una mejor tracción. Después de unos días, puede cambiar de a poco esa superficie antideslizante con un lecho hecho de paja picada, hojas trituradas de periódicos o cartón triturado. Siempre asegúrese de que el material se mantenga seco para disuadir la formación de

moho. Recuerde lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente después de cambiar el material del lecho o tocar los elementos en el área.

Ambiente caliente

Los pollitos deben mantenerse en un lugar cálido hasta que estén completamente emplumados. La temperatura en la parte inferior del área de incubación debe ser de 95 grados F en la etapa inicial y reducir al menos cinco grados cada semana hasta que los pollitos tengan un mes de edad. Coloque una lámpara de incubación sobre un lado del área de incubación para que los pollitos puedan elegir estar bajo la luz/calor o no. Es importante prestar atención al comportamiento de los pollitos para comprender si sienten calor o frío en la zona de incubación. Si los pollitos están amontonados directamente debajo de la fuente de calor, entonces tienen frío. Si están alrededor de los bordes del área de incubación, entonces tienen calor. Ajuste la altura de la lámpara según corresponda y dé suficiente espacio para que los pollitos puedan entrar y salir de la zona iluminada para regular sus temperaturas corporales. Para evitar incendios, asegúrese de que la lámpara de calor esté asegurada y ubicada lejos de materiales que puedan incendiarse. Como recordatorio, las aves de corral no deben mantenerse en áreas donde circulan los humanos, los baños o lugares donde se preparan/almacenan alimentos, como cocinas o patios al aire libre.

Alimentos y agua

Coloque el agua y la alimentación inicial del pollito en recipientes separados. Mantenga los alimentos y el agua limpios y libres de excrementos. Un bebedero de 5 cuartos de galón debería satisfacer adecuadamente a un máximo de 32 aves y un alimentador para pollitos de 7 lb puede alimentar hasta 15 aves. Si los pollitos no beben, sumérjeles los picos en el agua para que comiencen a beber. Un bebedero para pollitos es la mejor manera de darles agua. Los platillos u otros contenedores improvisados se derraman fácilmente, lo que hace que el área de incubación esté húmeda y sea antihigiénica. Nunca deje que los pollitos se queden sin agua. Para la alimentación, comience con una ración inicial de 18-20 % de proteína (24 % de proteína para los pollos de engorde). Entre las 8 y 10 semanas de edad, cambie la ración de los pollitos a un 18 a 19 % para el engorde.

Probabilidades y resultados

A medida que los pollitos crecen, comenzarán a querer posarse sobre alguna superficie alta para descansar. Proporcione perchas para el descanso ubicadas a unas pocas pulgadas del suelo. Puede hacerlo con un palo o una roca asegurados que puedan sostener el peso de las aves, para evitar que se ubiquen sobre el bebedero o comedero. A medida que los pollitos comienzan a emplumarse, durante los días cálidos, colóquelos en un corral de alambre al aire libre durante períodos cortos en un área sin corrientes de aire. Vigílelos y coloque una bandeja de arena para que puedan limpiarse. Cuando manipule a los pollitos, recuerde que es menos probable que se asusten si hace movimientos lentos.




Para obtener más
información, visite
TractorSupply.com/ChickDays

HEALTHY FAMILIES AND FLOCKS

Live poultry, such as chickens, ducks, geese, and turkeys, often carry harmful germs such as *Salmonella*. While it usually doesn't make the birds sick, *Salmonella* can cause serious illness when it is passed to people.

HANDWASHING PROTECTS YOU FROM GERMS



- Always wash your hands with soap and water right after touching live poultry or anything in the area where they live and roam.
- Adults should supervise handwashing for young children.
- Use hand sanitizer if soap and water are not readily available.

HANDLE BIRDS SAFELY



- Children younger than 5 years, adults older than 65 years, and people with weakened immune systems should not handle or touch chicks, ducklings, or other live poultry.
- Do not bring chicks, ducklings and other live poultry to schools, childcare centers, or nursing homes.
- Do not snuggle or kiss the birds, touch your mouth, or eat or drink around live poultry.

SAFELY CLEAN COOPS

- Clean any equipment used to care for live poultry outside, such as cages or feed or water containers.
- Set aside a pair of shoes to wear while taking care of poultry and keep those shoes outside of the house.



POULTRY BELONG OUTSIDE

- Do not let live poultry inside the house, especially in kitchens.
- Do not let live poultry in areas where food or drink is prepared, served, or stored.



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

Have a Backyard Flock? Don't Wing it.
Visit www.cdc.gov/backyardpoultry
for more information

CS274-178A