

BIOADVANCED
SCIENCE-BASED SOLUTIONS

365 WEED & GRASS KILLER

CONCENTRATE

**KILLS & PREVENTS
FOR UP TO
1 YEAR**

KILLS THE ROOT*

Visible results in hours



**12
MONTH
WEED
CONTROL**

ACTIVE INGREDIENTS:
Glufosinate-ammonium 10.00%
Ammonium nonanoate* 11.08%
Imazethapyr-ammonium** . . . 3.18%
OTHER INGREDIENTS: 75.74%
TOTAL: 100.00%

50144-0594g-22033101
* When used as directed
* Equivalent to 10.00% nonanoic (pelargonic) acid equivalent.
** Equivalent to 3.00% imazethapyr acid equivalent.
Contains 0.88 lbs Glufosinate ammonium, 0.88 lbs Nonanoic (pelargonic) acid, and 0.27 lbs Imazethapyr acid per gallon.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
WARNING** See inside booklet for additional
precautionary statements
and Directions for Use

**NET CONTENTS
28 FL OZ (828ml)**

PLANTS CONTROLLED

ALL TYPES
OF WEEDS



ALL TYPES
OF GRASSES



WHERE TO USE

AROUND TREES & SHRUBS



PATIOS



ALONG FENCES & FOUNDATIONS



FLOWER BEDS



DRIVEWAYS
& WALKWAYS



WHAT TO KNOW

RAINPROOF
IN HOURS



KILLS THE ROOT*



**When used as directed*

QUESTIONS & COMMENTS

Call toll-free 1-(877) 229-3724
or visit us online at
www.bioadvanced.com



†Or your money back.

50148315a 220331V1
EPA Reg. No. 45002-32-92564
EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the
batch number on this package. (65) = 92564-TX-1
(57) = 071106-GA-003 (42) = 88746-GA-01

PEEL
HERE

DIRECTIONS FOR USE It is a violation of federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

DO NOT use this product until you have read the entire label. **DO NOT** apply this product in a way that will contact workers or other persons, either directly or through drift. Only protected handlers may be in the area during application. For any requirements specific to your State or Tribe, consult the agency responsible for pesticide regulation.

In the State of New York Only: Not For Use in Nassau and Suffolk Counties.

NON AGRICULTURAL USE REQUIREMENTS

The requirements in this box apply to uses of this product that are NOT within the scope of the Worker Protection Standard for agricultural pesticides (40 CFR Part 170). The WPS applies when this product is used to produce agricultural plants on farms, forests, nurseries, or greenhouses. The application for trimming and edging, industrial, recreational and public areas, and farmsteads are not within the scope of the WPS.

MANDATORY SPRAY DRIFT

- **DO NOT** apply via air.
- **DO NOT** apply when wind speeds exceed 10 miles per hour at the application site.
- **DO NOT** apply during temperature inversions.
- Applicators must select nozzles and pressure that deliver coarse to coarser droplets in accordance with American Society of Agricultural & Biological Engineers Standard 527 (ASABE 572).
- Spray at the appropriate boom height based on nozzle selection and nozzle spacing, but **DO NOT** exceed a boom height of 24 inches above target pest or crop canopy. Set boom to lowest effective height over the target pest or crop canopy based on equipment manufacturer's directions. Automated boom height controllers are recommended with large booms to better maintain optimum nozzle to canopy height. Excessive boom height will increase the potential for spray drift.
- For non-crop vegetation management ground applications, apply with the nozzle height no more than 4 feet above the ground or target vegetation, unless necessitated by the application equipment. Examples would include roadside, railroad, utility rights of way, forestry and other industrial vegetation management applications where safety or natural barriers obstruct application.
- User must only apply with the release height recommended by the manufacturer, but no more than 3 feet above the ground or crop canopy unless making a turf, pasture, or rangeland application, in which case applicators may apply with a nozzle height no more than 4 feet above the ground.

SPRAY DRIFT ADVISORY

POLLINATOR ADVISORY This product contains an herbicide. Follow all label directions and precautions to minimize potential off-target exposure in order to prevent effects to non-target plants adjacent to the treated site which may serve as habitat or forage for pollinators.

SPRAY DRIFT MANAGEMENT The interaction of many equipment and weather-related factors determines the potential for spray drift. The applicator is responsible for considering all these factors when making application decisions.

Importance of Droplet Size: The most effective way to reduce drift potential is to apply large droplets. The best drift management strategy is to apply the largest droplets that provide sufficient coverage and control. The presence of sensitive species nearby, the environmental conditions, and pest pressure may affect how an applicator balances drift control and coverage. **APPLYING LARGER DROPLETS REDUCES DRIFT POTENTIAL BUT WILL NOT PREVENT DRIFT IF APPLICATIONS ARE MADE IMPROPERLY OR UNDER UNFAVORABLE ENVIRONMENTAL CONDITIONS!**

See Wind and Temperature and Humidity sections of this label.

Techniques for Controlling Droplet Size -

Volume – Use high flow rate nozzles to apply the highest practical spray volume. Nozzles with higher rated flows produce larger droplets.

Pressure – Use the lower spray pressures recommended for the nozzle.

Higher pressure reduces droplet size and does not improve canopy penetration. WHEN HIGHER FLOW RATES ARE NEEDED, USE A HIGHER-CAPACITY NOZZLE INSTEAD OF INCREASING PRESSURE.

Nozzle Type – Use a nozzle type that is designed for the intended application. With most nozzle types, narrow spray angles produce larger droplets. Consider using low-drift nozzles.

Boom Height - Setting the boom at the lowest referenced height (if specified) which provides uniform coverage reduces the exposure of droplets to evaporation and wind. For ground equipment, the boom should remain level with the crop and have minimal bounce.

Drift Reduction Technology (DRT) - The EPA Drift Reduction Technology (DRT) Program was developed to encourage the manufacturer, marketing, and use of spray technologies scientifically verified to significantly reduce pesticide drift. The use of DRTs should result in significantly less pesticide from spray applications drifting and being deposited in areas not targeted by those applications, compared to spray technologies that do not meet the minimum DRT standard. EPA-verified drift reduction technologies (DRTs) and their ratings will be added to the following webpage when they become available: <https://www.epa.gov/reducing-pesticide-drift/epa-verified-and-rated-drift-reduction-technologies>

Wind: Drift potential increases at wind speeds of less than 3 mph (due to inversion potential) or more than 10 mph. However, many factors including droplet size and equipment type determine drift potential at any given wind speed.

AVOID APPLICATIONS DURING GUSTY OR WINDLESS CONDITIONS.

Note: Local terrain can influence wind patterns. Every applicator needs to be familiar with local wind patterns and how they affect spray drift.

Temperature and Humidity: When making applications in hot and dry conditions, set up equipment to produce larger droplets to reduce effects of evaporation.

Temperature Inversions - Drift potential is high during a temperature inversion. Temperature inversions restrict vertical air mixing, which causes small suspended droplets to remain close to the ground and move laterally in a concentrated cloud. Temperature inversions are characterized by increasing temperature with altitude and are common on nights with limited cloud cover and light to no wind. They begin to form as the sun sets and often continue into the morning. Their presence can be indicated by ground fog; however, if fog is not present, inversions can also be identified by the movement of smoke from a ground source or an aircraft smoke generator. Smoke that layers and moves laterally in a concentrated cloud (under low wind conditions) indicates an inversion, while smoke that moves upward and rapidly dissipates indicates good vertical air mixing.

Shielded Sprayers - Shielding the boom or individual nozzles can reduce the effects of wind. However, it is the responsibility of the applicator to verify that the shields are preventing drift and not interfering with uniform deposition of the product.

PRODUCT INFORMATION

This product is a nonselective water-soluble herbicide for application as a foliar spray for the control of a broad-spectrum of emerged annual and perennial grass and broadleaf weeds on residential lawns, fence rows, and other non-crop sites. This product will also control certain woody species. Plants that have not yet emerged at the time of application will not be controlled.

THOROUGH SPRAY COVERAGE IS IMPORTANT.

Visual effects and control from application of this product will occur within 2 to 4 days after application under good growing conditions.

This product is nonselective and will injure or kill all green vegetation contacted by the spray. Avoid all contact with foliage or green tissue of desirable vegetation. Avoid direct spray contact with green, thin, or uncalloused bark of desirable vegetation or plant injury may result. If desirable vegetation is contacted, rinse the sprayed portion with water immediately.

This product works best when weeds are actively growing. Weed control may be reduced when applications are made to weeds under stress due to drought or cool temperatures. Weeds under stress or in dense populations will require application at the highest rate specified. Refer to the How to Apply section of this label.

Refer to the How to Apply section of this labeling for specified treatment rates and a list of weeds controlled. Applications may be made on a broadcast, banded or spot basis depending on the situation. Avoid direct spray or drift to desirable vegetation. Regrowth may occur due to the weed stage of growth at application, low use rate, or environmental conditions. Repeat treatments may be necessary to control plants generating from underground parts or seed.

RESTRICTIONS

Operations that involve mixing, loading, rinsing, or washing of this product into or from pesticide handling or application equipment or containers within 50 feet of any well are prohibited unless conducted on an impervious pad constructed to withstand the weight of the heaviest load that may be positioned on or moved across the pad. Such a pad shall be designed and maintained to contain any product spills or equipment leaks, container or equipment rinse or washwater, and rainwater that may fall on the pad. Surface water shall not be allowed to flow over or from the pad, which means the pad must be self-contained. The pad shall be sloped to facilitate material removal. An unroofed pad shall be of sufficient capacity to contain, at a minimum, 110% of the capacity of the largest pesticide container or application equipment on the pad.

A pad that is covered by a roof of sufficient size to completely exclude precipitation from contact with the pad shall have a minimum containment capacity of 100% of the capacity of the largest pesticide container or application equipment on the pad.

Containment capacities as described above shall be maintained at all times. The above specific minimum containment capacities do not apply to vehicles when delivering pesticide shipments to the mixing/loading site. States may have in effect additional requirements regarding wellhead setbacks and operational containment.

DO NOT apply this product through any type of irrigation.

Product must be used in a manner which will prevent back-siphoning in wells, spills, or improper disposal of excess pesticide spray mixture.

WHERE TO APPLY

For outdoor use only.

When applied as a spot or directed spray application, this product controls annual and perennial weeds listed on this label in non-crop areas including: Storage areas, Curbs, Sidewalks, Driveways, Parking areas, Brick walks, Gravel paths, Patios, Paved areas including cracks and crevice, Urban areas, Play areas, Fencerows, along fences of paddocks, Hedgerows, Dry ditchbanks, around Domestic dwellings, Shelter beds, dog kennels, under trees, in landscape beds and gardens.

TRIMMING AND EDGING

This product may be used for trimming and edging landscape areas including: around individual trees and shrubs, landscape beds, foundations, fences, driveways, paths.

WHEN TO APPLY

This product is a foliar-active material. Best results are obtained when weeds are actively growing. Apply on a sunny day with temperatures above 60° F. Weed control may be reduced when applications are made to weeds under stress due to drought or cool temperatures. Weeds under stress or in dense populations will require application of the highest rate specified. Refer to the How to Apply section of this label. This product must be applied at the rate specified in the How to Apply section of this label. Repeat applications of this product may be needed to control weeds emerging from underground parts or seeds.

HOW TO MIX

This product must be mixed with water to make a finished spray solution as follows:

1. Fill the spray tank with the required amount of water.
2. Add the proper amount of this product, then mix thoroughly.

USE RESTRICTIONS

1. **DO NOT** apply directly to or allow drift to contact desirable green tissue or green, thin, or uncalloused bark of desirable vegetation.
2. **DO NOT** apply to weeds when wet from dew, rain or water.
3. **DO NOT** apply if rainfall is expected within 2 hours.
4. Apply in a minimum of 10 gallons spray / acre
5. **DO NOT** apply to golf course putting greens or tees
6. **DO NOT** apply North of North Dakota Highway 13 or Minnesota Highway 10.
7. **DO NOT** apply directly to landscape ornamentals or ornamental beds.
8. **DO NOT** apply more than 75.0 Fl. Oz. (2.4 Quarts) (0.52 lbs glufosinate ai, 0.52 lbs nonanoic acid ai, 0.158 lbs imazethapyr ai) per acre per year.
9. **DO NOT** apply more than 35.5 Fl. Oz. (1.1 Quarts) (0.24 lbs glufosinate ai, 0.24 lbs nonanoic acid ai, 0.075 lbs imazethapyr ai) per acre per application.
10. **DO NOT** apply more than a total of 2 broadcast applications (excluding spot treatments) per year.
11. **DO NOT** make more than 3 spot applications (same spot no greater than 1000 sq. ft.) per year.
12. The minimum retreatment interval is 14 days.
13. **DO NOT** make broadcast application to residential lawns, make spot treatments only.
14. Spot treatment to residential lawns is limited to 1000 ft² per acre.
- DO NOT** apply more than 4.5 Fl. Oz. (0.031 lbs glufosinate ai, 0.031 lbs nonanoic acid ai, 0.009 lbs. imazethapyr ai) / spot treatment.
15. **DO NOT** apply this product through any type of irrigation system.
16. **DO NOT** apply to soils classified as sand with less than 1% organic matter
17. **DO NOT** allow grazing of vegetation treated with this product or feed livestock forage cut from treated areas.
18. **DO NOT** spray plants or grasses you like- they will die. Avoid spray contact of green plant stems or green bark of young trees and shrubs. Not recommended for spot weed control in lawns since this product kills lawn grasses.

HOW TO APPLY

Hand-held Equipment

Thorough saturation of the foliage and stems is required for control, but stop sprays when run-off from weed leaves occurs. Use low spray pressure to reduce foaming and avoid contact with desirable plants. Most spray nozzles are designed to operate at 10 to 15 psi and provide uniform spray coverage of weeds.

Directed Spray Equipment

Use a shielded sprayer to prevent spray contact on desirable plants.

Spot Or Directed Applications

This product may be used as a spot or directed spray application. Spray undesirable vegetation foliage on a spray-to-wet basis. **DO NOT** apply beyond runoff. Ensure uniform and complete coverage. Use a coarse spray. **DO NOT** spray during windy conditions. Backpack, pump-up, and hydraulic sprayers may be used. Thoroughly clean the sprayer following use.

Table 1. Amount of this product added to water to make 1 gallon of spray solution at dosages of 2.5 to 5.0%.

2.5 % solution	
Volume of Spray Solution	
1 Gallon	
Amount of this product	
3.2 Fl. Oz. (0.022 lbs glufosinate ai, 0.022 lbs nonanoic acid ai, 0.007 lbs imazethapyr ai)	

5.0 % solution	
Volume of Spray Solution	
1 Gallon	
Amount of this product	
6.4 Fl. Oz. (0.044 lbs glufosinate ai, 0.044 lbs nonanoic acid ai, 0.0135 lbs imazethapyr ai)	

WEEDS CONTROLLED

GRASSY WEEDS AND SEDGES

Bahiagrass	Bluegrass, annual	Dallisgrass	Goosegrass
Barley	Bromegrass,	Fall panicum	Nimblewill
Barnyardgrass	downy, smooth	Fescue, creeping	Nutsedge, yellow
Bentgrass, colonial	Carpetgrass	red, hard	Onion, wild
Bermudagrass,	Crabgrass, large	Foxtail, giant,	Rygrass, perennial
wireweed	Cupgrass	green, yellow	Star-of-Bethlehem

BRUSH SUPPRESSED OR CONTROLLED*

Blackberry	Honeysuckle	Poison ivy	Sweetgum
Deer Brush	Huckleberry	Poison oak	Thimbleberry
Douglas fir	Maple	Roundleaf	Trumpetcreeper
Gallberry	Multiflora rose	greenbriar	Vine maple
Hazel	Oak	Salmonberry	Western red cedar
	Pine	Sumac	

*Not for use in California

BROADLEAF WEEDS

Algae	Groundsel	Morningglory,	Purslane
Bittercress, hairy	Goldenrod	annual	Ragweed, common
Bindweed	Heath aster, white	Moss	Rocket, yellow
Buffalobur	Henbit	Mugwort	Russian thistle
Burdock	Horsetail	Mustards	Shepherd's purse
Canada thistle	Jimsonweed	Mullein	Smartweed
Chickweed,	Kochia	Nettle	Sorrel, sheep
common,	Lambsquarters,	Nightshade	Sowthistle, annual
mouse-ear	common	Nimblewill	Spurge, spotted
Clover	Leafy spurge	Oxalis	Thistle, musk
Cocklebur,	Liverwort	Pansy, wild	Velvetleaf
common	London rocket	Pennycress, field	Vervain
Corn spurry	Mallow,	Pigweed, red root	Virginia copperleaf
Dandelion	roundleaved	Plantain	Wild buckwheat
Dock, curly	Malva	Pigweed, smooth,	Wild mustard
Dogbane, hemp	(little mallow)	redroot	Wild onion
Filaree	Marestail	Pokeweed	Wild turnip
Fleabane, annual	Moneywort	Prickly lettuce	Woodsorrel

STORAGE AND DISPOSAL

DO NOT contaminate water, food, or feed by storage or disposal.

PESTICIDE STORAGE: Keep from freezing. **DO NOT** store below 32°F.

PESTICIDE DISPOSAL: Wastes resulting from the use of this product may be disposed of on-site or at an approved waste disposal facility.

CONTAINER HANDLING:

Nonrefillable Container. DO NOT reuse or refill this container. Triple rinse or pressure rinse container (or equivalent) promptly after emptying; then offer for recycling, if available, or reconditioning, if appropriate, or puncture and dispose of in a sanitary landfill, or by incineration, or by other procedures approved by state and local authorities.

Triple rinse containers small enough to shake (capacity < 5 gallons) as follows: Empty the remaining contents into application equipment or a mix tank and drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Fill the container ¼ full of water and recap. Shake for 10 seconds. Pour rinsate into application equipment or a mix tank, or store rinsate for later use or disposal. Drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Repeat this procedure two more times.

Triple rinse containers too large to shake (capacity > 5 gallons) as follows: Empty the remaining contents into application equipment or a mix tank. Fill the container ¼ full of water. Replace and tighten closures. Tip container on its side and roll it back and forth, ensuring at least one complete revolution, for 30 seconds. Stand the container on its end and tip it back and forth several times. Turn the container over onto its other end and tip it back and forth several times. Empty the rinsate into application equipment or a mix tank, or store rinsate for later use or disposal. Repeat this procedure two more times.

Pressure rinse as follows: Empty the remaining contents into application equipment or a mix tank and continue to drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Hold container upside down over application equipment or mix tank or, collect rinsate for later use or disposal. Insert pressure rinsing nozzle in the side of the container and rinse at about 40 PSI for at least 30 seconds. Drain for 10 seconds after the flow begins to drip.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

DO NOT apply directly to water, or to areas where surface water is present, or to intertidal areas below the mean highwater mark. **DO NOT** clean equipment or dispose of equipment washwaters in a manner that will contaminate water resources or land.

Surface Water Advisory: This product may impact surface water quality due to runoff of rain water. This is especially true for poorly draining soils and soils with shallow ground water. This product is classified as having high potential for reaching surface water via runoff for several months or more after application. A level, well-maintained vegetative buffer strip between areas to which this product is applied and surface water features such as ponds, streams, and springs will reduce the potential loading of imazethapyr from runoff water and sediment. Runoff of this product will be reduced by avoiding applications when rainfall or irrigation is expected to occur with 48 hours.

DO NOT use on coarse soils classified as sand which have less than 1% organic matter.

Groundwater Advisory: Glufosinate-ammonium and imazethapyr-ammonium have properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of this product in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination. This product may not be mixed or loaded within 50 feet of any wells (including abandoned wells and drainage wells), sinkholes, perennial or intermittent streams and rivers, and natural or impounded lakes or reservoirs. This setback does not apply to properly capped or plugged abandoned wells and does not apply to impervious pad or properly diked mixing/loading areas.

Non-Target Organism Advisory: This product is toxic to plants and may adversely impact the forage and habitat of non-target organisms, including pollinators, in areas adjacent to the treated site. Protect the forage and habitat of non-target organisms by following label directions intended to minimize spray drift.

IMPORTANT: READ BEFORE USE Read the entire Directions for Use, Conditions, Disclaimer of Warranties and Limitations of Liability before using this product. If terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties and Limitations of Liability.

CONDITIONS: The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness or other unintended consequences may result because of such factors as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of SBM Life Science Corp. All such risks shall be assumed by the user or buyer.

DISCLAIMER OF WARRANTIES: TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, SBM Life Science Corp MAKES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE, THAT EXTEND BEYOND THE STATEMENTS MADE ON THIS LABEL. No agent of SBM Life Science Corp is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, SBM Life Science Corp DISCLAIMS ANY LIABILITY WHATSOEVER FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR HANDLING OF THIS PRODUCT.

LIMITATIONS OF LIABILITY: TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE USER OR BUYER FOR ANY AND ALL LOSSES, INJURIES OR DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR HANDLING OF THIS PRODUCT, WHETHER IN CONTRACT, WARRANTY, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID, OR at SBM Life Science Corp. ELECTION, THE REPLACEMENT OF PRODUCT.

INDICACIONES DE USO Constituye una violación a la ley federal usar este producto en una manera diferente a lo expuesto en esta etiqueta.

NO usar este producto hasta que haya leído la etiqueta completa. **NO** aplicar este producto de modo que entre en contacto con personas o mascotas ya sea directamente o por goteo. Solo pueden estar en el área las personas que cuenten con protección. Para conocer todo requisito específico para su estado o tribu, consulte a la agencia responsable de la reglamentación de pesticidas. Solamente en el estado de New York: no puede usarse en los condados de Nassau y Suffolk.

REQUISITOS PARA USO NO AGRÍCOLA

Los requisitos en esta casilla aplican a los usos de este producto que **NO** están dentro del alcance de la norma estándar para el trabajador para pesticidas agrícolas (40 CFR Parte 170). Esta norma aplica cuando este producto se usa para producir plantas agrícolas en granjas, bosques, viveros o invernaderos. La aplicación para poda y cortes de brotes, áreas industriales, recreativas y públicas y para casas de hacienda no está dentro del alcance de la norma.

ADMINISTRACIÓN OBLIGATORIA ANTE LA DERIVA DE PESTICIDAS

- **NO** aplicar por vía aérea.
- **NO** aplicar cuando la velocidad del viento exceda las 10 millas por hora en el lugar de la aplicación.
- **NO** aplicar durante inversión térmica.
- Las personas que se encargan de la aplicación deben seleccionar las boquillas y la presión que produzca gotas entre gruesas y bien gruesas de acuerdo con lo que dispone la Sociedad Americana de Ingenieros Agrícolas y Biológicos-Estándar 527 (ASABE 572).
- Rociar a la altura del brazo que corresponda de acuerdo con la selección de boquilla y el espacio de la boquilla **PERO QUE NO** exceda la altura del brazo de 24 pulgadas por encima de la plaga objetivo o en la copa del cultivo. Configurar el brazo a la altura efectiva más baja en las plagas objetivo o copa de cultivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante del equipo. Se recomienda usar controladores automatizados de altura del brazo con brazos largos para mantener una altura óptima del brazo en relación a la copa. Una altura excesiva del brazo aumentará el potencial de deriva.
- Para manejo de aplicaciones en el suelo para vegetación que no sea cultivo, aplicar a una altura de la boquilla no mayor a 4 pies por encima del suelo o de la vegetación objetivo, a menos que sea necesario hacerlo debido al equipo de aplicación. Los ejemplos incluyen carreteras, vías, derechos de paso de servicios públicos, explotación forestal y otras aplicaciones para la administración de vegetación industrial en donde la seguridad o las barreras naturales obstruyan la aplicación.
- El usuario deberá aplicarlo con la altura de rocío recomendada por el fabricante, pero no más de 3 pies por encima del suelo o de la copa del cultivo al menos que esté haciendo una aplicación al pasto, pastura o pastizal con una altura de la boquilla que no supere los 4 pies por encima del suelo.

ADMINISTRACIÓN DE LA DERIVA DE PESTICIDAS

AVISO DE AGENTES POLINIZADORES Este producto contiene un herbicida. Siga las instrucciones y las precauciones de la etiqueta para minimizar la posible exposición fuera del objetivo para prevenir efectos a plantas que no están dentro del objetivo y que se encuentren ceca de las áreas a tratar que pueden servir como hábitat o forraje para agentes polinizadores.

ADMINISTRACIÓN DE LA DERIVA DE PESTICIDAS La interacción de varios factores climáticos y de los equipos determina el potencial de deriva del pesticida. La persona que aplica el producto es responsable de considerar todos estos factores cuando tome decisiones en cuanto a la aplicación.

Importancia del tamaño de la gota: El modo más efectivo de reducir la posible deriva es aplicar gotas grandes. La mejor estrategia para la administración del goteo es aplicar las gotas más grandes que provean control y cobertura suficiente. La presencia de especies sensibles en las cercanías, las condiciones ambientales y la presión de la plaga puede afectar cómo la persona que aplica el producto, equilibra la cobertura y el control de gotas.

¡LA APLICACIÓN DE GOTAS MÁS GRANDES REDUCE EL POTENCIAL DE DERIVA PERO NO IMPEDIRÁ LA DERIVA SI LAS

APLICACIONES SE HACEN DE MANERA INCORRECTA O EN CONDICIONES AMBIENTALES NO FAVORABLES! Consulte las secciones de viento, temperatura y humedad en esta etiqueta.

Técnicas para controlar el tamaño de las gotas

Volumen – Usar boquillas con proporción de flujo alto para aplicar el volumen de rocío práctico más alto. Las boquillas con flujos más altos producen gotas más grandes. **Presión** – Usar la presión de rocío más baja recomendada para la boquilla. La presión más alta reduce el tamaño de la gota y no mejora la penetración en la copa. **CUANDO SE NECESITAN PROPORCIONES DE FLUJO MÁS ALTAS, USAR UNA BOQUILLA DE CAPACIDAD MÁS ALTA EN LUGAR DE AUMENTAR LA PRESIÓN.** **Tipo de boquilla** – Usar un tipo de boquilla que esté diseñada para la aplicación. Con la mayoría de los tipos de boquillas, los ángulos estrechos del rociador producen gotas más grandes. Considere la posibilidad de usar boquillas de baja deriva. **Altura del brazo** - configurar el brazo a la altura de referencia más baja (si se especifica) que produce una cobertura uniforme y reduce la exposición de las gotas a la evaporación y al viento. Para equipo de tierra, el brazo debe permanecer a nivel con el cultivo y tener una capacidad de rebote mínima.

Tecnología de reducción de deriva (DRT) - El programa EPA de tecnología de reducción de deriva (DRT) fue desarrollado para alentar al fabricante, al vendedor y el uso de tecnologías de rocío desarrolladas científicamente para reducir, de manera significativa, la deriva de los pesticidas. El uso de DRT debe producir una cantidad significativamente menor de deriva de pesticidas que resulta de las aplicaciones por rocío y que se depositan en áreas a donde el pesticida no debía llegar, comparado con las tecnologías de rocío que no cumplen con el estándar mínimo de DRT. La tecnología de reducción de deriva (DRT) verificada por EPA y sus clasificaciones serán agregadas a la página web cuando estén disponibles: <https://www.epa.gov/reducing-pesticide-drift/epa-verified-and-rated-drift-reduction-technologies> **Viento** - Las posibilidades de que ocurra la deriva del pesticida aumentan con la velocidad del viento de menos de 3 mph (debido al potencial de inversión) o más de 10 mph. Sin embargo, muchos factores, incluyendo el tamaño de la gota y el tipo de equipo determina la posibilidad de deriva a una velocidad dada de viento. **EVITE**

APLICACIONES DURANTE CONDICIONES CLIMÁTICAS DE RÁFAGAS O SIN VIENTO

Nota: El terreno local puede tener influencia en los patrones del viento. Cada persona que aplica el producto debe estar familiarizada con los patrones del viento local y cómo estos afectan la deriva. **Temperatura y humedad** - Cuando haga aplicaciones en condiciones climáticas calurosas y secas, configure el equipo para que produzca gotas más grandes para reducir los efectos de la evaporación. **Inversión térmica** - El potencial de deriva es alto durante una inversión térmica. La inversión térmica limita la mezcla vertical de aire, que hace que las gotas pequeñas suspendidas permanezcan cerca del suelo y se muevan lateralmente en una nube concentrada. La inversión térmica se caracteriza por un aumento de temperatura con altitud y son comunes en las noches con cobertura limitada de nubes y de viento leve o sin viento. Comienzan a formarse a medida que el sol se pone y a menudo continúan por la mañana. La niebla de tierra puede indicar su presencia; sin embargo, si no hay niebla presente, la inversión puede identificarse por el movimiento del humo desde una fuente o un generador de humo de la avioneta. El humo que se separa en capas y se mueve lateralmente en una nube concentrada (bajo

condiciones de poco viento) indica una inversión, mientras que el humo que se mueve hacia arriba y rápidamente se disipa indica una buena mezcla vertical.
Rociadores resguardados - La protección del brazo o de las boquillas individuales puede reducir el efecto del viento. Sin embargo, es responsabilidad de la persona que aplica el producto verificar que los resguardos estén impidiendo la deriva y que no interfieran con la deposición uniforme del producto.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto es un herbicida no selectivo soluble en agua para aplicación como rocío en las hojas postemergentes para el control de un amplio espectro de malezas de hoja ancha y pasto perenne y anual en céspedes residenciales, vallados y otros lugares donde no se cultiva. Este producto controlará además ciertas especies leñosas. No controlará a las plantas que no hayan aparecido al momento de la aplicación. **ES IMPORTANTE CUBRIR COMPLETAMENTE EL FOLLAJE.** Los efectos visuales y el control a partir de la aplicación de este producto ocurrirán dentro de los 2 a 4 días luego de la aplicación en buenas condiciones de crecimiento. Este producto es no selectivo y dañará o matará toda vegetación verde que entre en contacto con el rocío. Evite todo contacto con tejido verde o follaje de plantas que desee conservar. Evite el rocío directo con corteza verde, delgada o sin callos de plantas que desee conservar o la planta puede resultar dañada. Si entra en contacto con plantas que usted desea conservar, enjuague inmediatamente la parte que haya rociado con agua. Este producto funciona mejor cuando las malezas están en crecimiento activo. El control de malezas puede reducirse cuando las aplicaciones se hacen a las malezas bajo estrés por temperaturas frías o sequía. Las malezas bajo estrés o en poblaciones densas necesitarán de una aplicación con la proporción más alta especificada. Consulte la sección Cómo aplicarlo de esta etiqueta para acceder a información sobre proporción de aplicación apropiada y a la lista de malezas controladas. Las aplicaciones pueden hacerse a modo de difusión, tratamiento localizado o en bandas, dependiendo de la situación. Evite rociar de manera directa o la deriva a vegetación que desee conservar. El nuevo crecimiento puede ocurrir debido a la etapa de crecimiento de la maleza al momento de la aplicación, proporción baja de uso o condiciones ambientales. Puede ser necesario repetir los tratamientos para controlar la generación de las plantas desde la semilla o desde la parte subterránea.

RESTRICCIONES

Las operaciones que implican mezclado, carga o lavado de este producto en o desde la manipulación del pesticida o del equipo de aplicación o los recipientes dentro de los 50 pies de cualquier pozo están prohibidas a menos que se lleven a cabo en una estera impermeabilizante construida a modo de soporte del peso de la carga más pesada que puede colocarse o moverse por la estera. Tal estera debe estar diseñada y debe mantenerse para contener todo derrame del producto o fugas en el equipo, recipiente o en el equipo de lavado o enjuague y agua de lluvia que puede caer sobre la estera. No se debe permitir que el agua de la superficie fluya sobre o desde la estera; esto significa que la estera debe estar autocontenida. La estera debe estar inclinada para facilitar la remoción del material. Una estera sin techo tendrá la capacidad suficiente como para contener, como mínimo, 110% de la capacidad del recipiente del pesticida más grande o el equipo de aplicación sobre la estera. Una estera cubierta con un techo del tamaño suficiente para excluir por completo las precipitaciones del contacto con la estera deberá tener una capacidad de contención mínima del 100% de la capacidad del recipiente del pesticida más grande o del equipo de aplicación sobre la estera. Las capacidades de contención tal como se describen arriba deben mantenerse en todo momento. Las capacidades de contención mínimas antes mencionadas no aplican a vehículos cuando se entregan cargamentos de pesticida en lugares de carga/mezcla. Algunos estados pueden tener en vigencia requisitos adicionales sobre los desniveles de bocas de pozos y contención operativa. **NO** aplicar este producto a través de algún sistema de riego. El producto debe usarse de manera tal que impida la circulación con sifonaje al revés en pozos, derrames o desechos no adecuados de mezcla de rocío de exceso de pesticida.

DÓNDE APLICARLO

Para uso en exteriores solamente.

Cuando se aplica con aplicación dirigida mediante rocío o tratamiento localizado, este producto controla las hierbas perennes y anuales que aparecen en la lista en esta etiqueta en área de no cultivo, incluyendo: áreas de almacenamiento, curvas, aceras, caminos, áreas de estacionamiento, caminos de ladrillo, caminos de grava, patios, áreas pavimentadas incluyendo grietas, áreas urbanas, áreas de juego, verjas, a lo largo de cercas de verjas, setos, zanjas secas, alrededor de pozos domésticos, refugios, refugios para perros, debajo de los árboles, en jardines y canteros. **RECORTE Y RIBETE.**

Este producto puede usarse para recortar y podar brotes en diferentes zonas, incluyendo: alrededor de árboles y arbustos individuales, en canteros, cimientos, verjas, caminos, senderos

CUÁNDO APLICAR

Este producto es un material activo al follaje. Este producto funciona mejor cuando las malezas están en crecimiento activo. Aplicar un día de sol con temperaturas por encima de los 60° F. El control de malezas puede reducirse cuando las aplicaciones se hacen a las malezas bajo estrés por temperaturas frías o sequía. Las malezas bajo estrés o en poblaciones densas necesitarán de una aplicación con la proporción más alta especificada. Consulte la sección Cómo aplicarlo de esta etiqueta. Este producto debe aplicarse en la proporción especificada en la sección Cómo aplicar de esta etiqueta. Puede ser necesario repetir las aplicaciones de este producto para controlar las malezas que emergen desde las parte bajo suelo o de semillas.

CÓMO MEZCLAR

Este producto debe mezclarse con agua para producir una solución de rocío terminada de la siguiente manera:

1. Llenar el tanque de rocío con la cantidad requerida de agua.
2. Agregar la cantidad correcta de este producto, luego mezclar cuidadosamente.

RESTRICCIONES DE USO

1. **NO** aplicar directamente y tampoco permitir la deriva a tejido verde que se desee conservar o a corteza verde, delgada y sin callos de vegetación deseada.
2. **NO** aplicar en hierbas cuando están húmedas por el rocío, lluvia y agua.
3. **NO** aplicar si se espera lluvia dentro de las 2 horas de la aplicación.
4. Aplicar un mínimo de 10 galones de rocío por acre. **5. NO** aplicar en putting greens de campos de golf o árboles **6. NO** aplicar al norte de la autopista de North Dakota 13 o en la autopista Minnesota 10. **7. NO** aplicar directamente en macetas decorativas o decoraciones paisajistas. **8. NO** aplicar más de 75.0 onzas líquidas (2.4 cuartos) (0.52 libras de glufosinato ai, 0.52 libras de ácido de nonanoico ai, 0.158 libras de imazetapir ai) por acre por año. **9. NO** aplicar más de 35.5 onzas líquidas (1.1 cuartos) (0.24 libras de glufosinato ai, 0.24 libras de ácido de nonanoico ai, 0.075 libras de imazetapir ai) por acre por aplicación. **10. NO** aplicar más de un total de 2 aplicaciones por difusión por año (excluyendo tratamientos localizados). **11. NO** hacer más de 3 aplicaciones localizadas (el manchón no tiene que ser mayor a 1000 pies cuadrados) por año. **12.** El intervalo de tratamiento mínimo es de 14 días. **13. NO** hacer una aplicación al voleo en céspedes residenciales, hacer tratamientos localizados solamente. **14.** El tratamiento localizado en céspedes residenciales debe limitarse a 1000 pies cuadrados por acre. **NO** aplicar más de 4.5 onzas líquidas (0.031 libras de glufosinato ai, 0.031 libras de ácido de nonanoico ai, 0.009 libras de imazetapir ai) por tratamiento localizado. **15. NO** aplicar este producto a través de algún sistema de riego. **16. NO** aplicar a suelos ásperos clasificados como arena que tienen menos del 1% de materia orgánica. **17. NO** permitir el

pastoreo de la vegetación tratada con este producto tampoco alimentar al ganado con forraje cortado de estas áreas tratadas. **18. NO** rociar plantas o césped que sean de su agrado – van a morir. Evitar el contacto del rocío con los tallos de plantas verdes o corteza verde de arbustos o árboles jóvenes. No está recomendado para controlar malezas al azar ya que este producto mata las gramíneas para césped.

CÓMO APLICARLO

Equipo sostenido a mano Es necesario que el follaje y los tallos queden bien mojados para su control, pero detenga el rocío cuando comience a correr el producto por las hojas de las hierbas. Use una presión de rocío baja para reducir la formación de espuma y evitar el contacto con las plantas que usted aprecia. La mayoría de las boquillas de rocío están diseñadas para funcionar entre 10 a 15 psi y para brindar cobertura uniforme mediante rocío de las hierbas. **Equipo de rocío dirigido** Use un rociador con resguardo para impedir que el rocío entre en contacto con las plantas que usted desea conservar. **Aplicaciones dirigidas o localizadas** Este producto puede usarse a modo de aplicación de rocío dirigido o de tratamiento localizado. Rociar el follaje no deseado sobre una base de rociar para humedecer. **NO** aplicar en la escorrentía. Asegúrese de hacer una cobertura completa e uniforme. Usar un rociador grueso. **NO** rociar si hay viento. Puede usar rociadores hidráulicos, tipo mochila o de bombeo. Limpie cuidadosamente el rociador luego de su uso.

Tabla 1. Cantidad de este producto agregado a agua para hacer 1, 1 galón de solución de rocío en dosificación de 2.5 a 5.0%.

2.5 % de solución	
Volumen de solución de rocío	
1 galón	
Cantidad de producto	
3.2 de onzas líquidas	
(0.022 libras de glufosinato ai, 0.022 libras de ácido de nonanoico ai, 0.007 libras de imazetapir ai)	

5.0 % de solución	
Volumen de solución de rocío	
1 galón	
Cantidad de producto	
6.4 onzas líquidas	
(0.044 libras de glufosinato ai, 0.044 libras de ácido de nonanoico ai, 0.0135 libras de imazetapir ai)	

MALEZAS CONTROLADAS

Hierbas y junquillos del pasto

Hierva bahia	Agrostis colonial	Nimblewill	Zácate cangrejo,
Heno leñoso	Cola de zorro,	Bromus tectorum,	grande
Cebada	gigante, verde, dura	suave	Ryegrass, perenne
Fall panicum	Césped Bermuda	Juncia real amarilla	Paspalo
Echinochloa	(knotweed erecto)	Césped alfombra,	Estrella de Belén
Cañuela roja	Goosegrass	grande	
rastrera, dura	Césped azul anual	Cebolla salvaje	

Malezas de hoja ancha

Algas	Goldenrod	Aster de brezo	Mostacilla común
Bittercress peludo	Artemisa	blanco	Verbena
Corregüela	Mostaza	Cardo ruso	Malva, hoja
Solanáceas	Mirido	Ortiga muerta	redonda
Bardana	Ortiga	Bolsa del pastor	Parra virgen
Cardo de Canadá	Solanáceas	Cola de caballo	Malva (malva
Oreja de ratón,	Nimblewill	Persicaria	pequeña)
común	Oxalis	Estramonio	Alforfón silvestre
Trébol	Viola	Acederilla	Hierba carnícera
Bardana menor	Carraspique de	Pinillo	Mostaza silvestre
común	campo	Agrilla anual	Hierba de la
Esparcilla	Amaranto, suave,	Quinoa, común	moneda
Diente de león	raíz roja	Euphorbia,	Cebolla silvestre
Acedera, rizada	Fitolaca	manchada	Gloria de un
Matacán, cáñamo	Lechuga espinosa	Euphorbia esula	día, anual
Filaree	Verdolaga	Cardo pendiente	Nabo silvestre
Fleabane, anual	Ambrosia común	Plantas hepáticas	Moho
Senecio	Cohete, amarillo	Malva terciopelo	Trébol ácido

Malezas controladas o suprimidas*

Zarzamora	Maleza verde de	Zumaque	Rosa multiflora
Hiedra venenosa	hoja redonda	Madreselva	Arce enredadera
Maleza del ciervo	Ilex glabra	Sweetgum	Robles
Roble venenoso	Zarza	Arces	Tuya gigante
Abeto de Douglas	Avellano	Campsis radicans	

*No puede usarse en California

PELIGROS AMBIENTALES

NO aplicar directamente en el agua o en áreas donde hay agua superficial presente o en áreas cercanas por debajo de la marca de agua promedio.

NO limpiar equipo o desechar equipo de agua de lavado de manera tal que contamine recursos hídricos o tierras cultivables. **Asesoramiento sobre aguas superficiales:** Este pesticida puede tener impacto en la calidad del agua si drena al agua de lluvia. Esto ocurre en suelos con mal drenaje y suelos con aguas subterráneas poco profundas. Este producto está clasificado como que tiene un alto potencial de alcance al agua de la superficie a través del drenaje durante varios meses o más después de su aplicación. Una faja de contención con vegetación a nivel, bien mantenido entre las áreas donde se aplica este producto y el agua superficial tal como lagunas, arroyos y fuentes reducirá el potencial de descarga de imazetapir al agua de drenaje y a los sedimentos. El drenaje de este producto se verá reducido si evita aplicaciones cuando se esperan precipitaciones o riego dentro de las 48 horas. **NO** usar en suelos ásperos clasificados como arena que tienen menos del 1% de materia orgánica. **Asesoramiento sobre aguas subterráneas:** El glufosinato de amonio y el amonio de imazetapir tienen propiedades y características asociadas a químicos detectados en las aguas subterráneas. El uso de este producto en áreas donde los suelos son permeables, particularmente donde la masa de agua es poco profunda, puede resultar en contaminación de las aguas subterráneas. Este producto no puede mezclarse o cargarse dentro de los 50 pies de un pozo (incluyendo pozos abandonados y pozos de drenaje), claros orlados, ríos y arroyos perennes o intermitentes y reservorios o lagos naturales o en reserva. Este recaudo no aplica a pozos abandonados bien tapados o cubiertos y no aplica a áreas de carga/mezcla con diques apropiados o esteras impermeabilizantes.

Asesoramiento sobre organismos que no forman parte del objetivo: Este producto es tóxico para plantas y puede tener impacto adverso en el forraje y en el hábitat de organismos que no sean parte de su objetivo, incluyendo los polinizadores, en áreas adyacentes al lugar del tratamiento. Proteja el forraje y el hábitat de los organismos que no son su objetivo siguiendo las instrucciones de la etiqueta que tienen el objetivo de minimizar la deriva del producto.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

NO contaminar alimentos, agua o alimentaciones por almacenamiento o eliminación. **ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** Evite el congelamiento. **NO** almacenar por debajo de los 32°F. **COMO DESECHAR EL PESTICIDA:** Los desechos que resulten del uso de este producto pueden eliminarse en un lugar o en un centro aprobado para la eliminación de desechos de este tipo.

MANIPULACIÓN DEL CONTENEDOR: Contenedor no rellenable: **NO** rellenar o volver a usar este contenedor. Enjuagar tres veces o enjuagar con presión el recipiente (o equivalente) oportunamente luego de vaciar, luego entregar para su reciclado, si la opción está disponible, o reacondicionar, si corresponde, o hacer una perforación y desechar en un vertedero sanitario, o mediante incineración o mediante otros procedimientos aprobados por las autoridades locales o estatales. **Enjuagar tres veces los recipientes pequeños como para agitarlos (capacidad < 5 galones) de la siguiente manera:** Vaciar el contenido restante en el equipo de aplicación o una mezcla de tanque y drenaje durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Llenar el recipiente ¼ lleno de agua y volver a tapar. Agitar durante 10 segundos. Verter la sustancia de enjuague en el equipo de aplicación o tanque de mezclado o almacenar la sustancia de enjuague para uso posterior o para desechar. Drenar durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Repetir este procedimiento dos veces más. **Enjuagar tres veces los recipientes demasiado grandes como para agitarlos (capacidad > 5 galones) de la siguiente manera:** Vaciar el contenido restante en el equipo de aplicación o en un tanque de mezclado. Llenar el recipiente ¼ lleno de agua. Reemplazar y ajustar los cierres. Inclinar el recipiente sobre un lado y rodar hacia adelante y hacia atrás, asegurándose de por lo menos completar una revolución, durante 30 segundos. Parar el recipiente y volver a inclinarlo hacia adelante y hacia atrás varias veces. Girar el recipiente sobre el otro lado y volver a inclinarlo hacia adelante y hacia atrás varias veces. Vaciar la sustancia de enjuague en el equipo de aplicación o tanque de mezclado o almacenar la sustancia de enjuague para uso posterior o para desechar. Repetir este procedimiento dos veces más. **Enjuagar a presión de la siguiente manera:** Vaciar el contenido restante en el equipo de aplicación o una mezcla de tanque y drenaje durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Sostener el recipiente al revés sobre el equipo de aplicación o el tanque de mezcla, recoger la sustancia de enjuague para uso posterior o desechar. Insertar la boquilla de presión de enjuague en el lado del recipiente y enjuagar a alrededor de 40 PSI durante por lo menos 30 segundos. Drenar durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear.

IMPORTANTE: LEER ANTES DE USAR Lea las Instrucciones de uso, Condiciones de venta y Exenciones de responsabilidad y limitaciones de responsabilidad completas y antes de usar este producto. Si los términos no son aceptables, devuelva el contenedor del producto sin abrir. Al usar este producto, el usuario o el comprador aceptan las siguientes condiciones, exenciones de garantía y limitaciones de responsabilidad. **CONDICIONES:** Las instrucciones de uso para este producto se consideran adecuadas y deben cumplirse cuidadosamente. Sin embargo, es imposible eliminar todos los riesgos asociados al uso de este producto. El daño al cultivo, la falta de eficacia y otras consecuencias no intencionadas pueden resultar por factores tales como condiciones climáticas, presencia de otros materiales o la manera de uso o aplicación, todos los cuales están fuera del control de SBM Life Science Corp. Tales riesgos deben ser asumidos por el usuario o comprador. **EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:** HASTA DONDE CORRESPONDA SEGÚN LA LEY, SBM Life Science Corp. NO GARANTIZA, DE MANERA EXPRESA O IMPLÍCITA, LA MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN OBJETIVO PARTICULAR O DE ALGUNA OTRA MANERA, QUE SE EXTIENDE MÁS ALLÁ DE LA DECLARACIÓN EN ESTA ETIQUETA. Ningún agente de SBM Life Science Corp está autorizado a ofrecer garantías más allá de las contenidas aquí o de modificar las garantías aquí contenidas. HASTA DONDE CORRESPONDA SEGÚN LA LEY QUE APLICA, SBM Life Science Corp QUEDA EXENTO DE TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, IMPREVISTOS O RESULTADOS DEL USO DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. **LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:** HASTA DONDE CORRESPONDA DE ACUERDO A LA LEY, LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA DEL USUARIO O COMPRADOR POR ALGUNA Y TODAS LAS PERDIDAS, LESIONES O DAÑOS QUE RESULTEN DEL USO O MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO, YA SEA POR CONTRATO, GARANTÍA, PERJUICIOS, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD TERMINANTE O ALGUNA OTRA RAZÓN, NO DEBERÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO, O A ELECCIÓN DE SBM Life Science Corp, EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO.

PRIMEROS AUXILIOS

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS • Mantenga los ojos abiertos y enjuague con abundante agua durante 15-20 minutos • Quite los lentes de contacto después de 5 minutos, continúe enjuagando • Llame al centro de control de envenenamiento o al médico para que le avisen sobre la necesidad de un tratamiento

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL • Quite la ropa contaminada • Enjuague la piel inmediatamente con mucha agua durante 15-20 minutos • Llame al centro de control de envenenamiento o a un médico para buscar asesoramiento.

SI LO TRAGA • Llame al centro del control de envenenamiento o al médico para buscar asesoramiento • Haga que la persona beba un sorbo de agua si puede tragar • **NO** induzca el vómito a menos que un médico o el centro de control de envenenamiento le indique hacerlo • **NO** dé nada por boca a una persona inconsciente

SI LO INHALA • Lleve la persona al aire fresco • Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego administre respiración artificial, preferentemente boca a boca • Llame al centro del control de envenenamiento o al médico para buscar asesoramiento
En caso de emergencia, llame a la línea gratuita 1-877-229-3763. Tenga un recipiente o etiqueta del producto con usted cuando llame al centro de control de envenenamiento o al médico o cuando tenga un tratamiento.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Peligro para seres humanos o animales domésticos

AVISO: Causa lesión importante pero temporal en los ojos. NO dejar que ingrese en los ojos o en la ropa. Evitar contacto con la piel. Lavar cuidadosamente con agua y jabón luego de manipularlo y antes de comer, beber, masticar goma de mascar, usar tabaco o ir al baño. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de volver a usar.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE)

Las personas que aplican el producto y otras que manipulen el producto deben usar: 1. Camiseta manga larga y pantalones largos; 2. Guantes resistentes a químicos tales como los laminados de caucho butílico >caucho nitrilo de 14 mils >caucho neopreno de 14 mils > cloruro de polivinílico (PVC) de 14 mils >14 mils o viton >14 mils; 3. Zapatos y calcetines; 4. Vestimenta de protección (gafas, máscara protectora, o anteojos de seguridad).

REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

Descartar toda vestimenta u otros materiales absorbentes que se hayan impregnado o estén muy contaminados con este concentrado del producto. **NO** volver a usarlos. Seguir las instrucciones del fabricante para la limpieza/mantenimiento del PPE. Si no existen instrucciones para lavado a mano, usar detergente y agua caliente. Mantener y lavar el PPE separado del resto de la ropa para lavar.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

Los usuarios deben: • Quitarse la ropa/PPE inmediatamente si el pesticida ingresa. Luego lavarlas cuidadosamente y ponerse ropa limpia. • Quitarse el PPE inmediatamente luego de manipular este producto. Lavar la parte externa de los guantes antes de quitárselos. Tan pronto como sea posible, lavarse cuidadosamente y ponerse ropa limpia.

PELIGROS QUÍMICOS O FÍSICOS NO mezclar o tener contacto con el agente oxidante. Puede ocurrir una reacción química peligrosa.

EPA Reg. No. 45002-32-92564
EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the
batch number on this package. (65) = 92564-TX-1
(57) = 071106-GA-003 (42) = 88746-GA-01

Distributed by:
SBM Life Science Corp.
1001 Winstead Drive,
Suite 500, Cary, NC 27513

BioAdvanced® is a registered trademark
of SBM Life Science Corp.

BIOADVANCED
SCIENCE-BASED SOLUTIONS

365 WEED & GRASS KILLER CONCENTRATE

FIRST AID

IF IN EYES • Hold eyes open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. • Remove contact lenses after the first 5 minutes, then continue rinsing. • Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF ON SKIN** • Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice. **IF SWALLOWED** • Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • **DO NOT** induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. • **DO NOT** give anything by mouth to an unconscious person. **IF INHALED** • Move person to fresh air. • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. • Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

In case of emergency call toll free 1-877-229-3763

Have a product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

WARNING: Causes substantial but temporary eye injury. **DO NOT** get in eyes or on clothing. Avoid contact with skin. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

Applicators and other handlers must wear: • Long-sleeved shirt and long pants • Chemical resistant gloves such as barrier laminate butyl rubber >14 mils nitrile rubber >14 mils neoprene rubber >14 mils polyvinyl chloride (PVC) >14 mils or Viton >14 mils • Shoes plus socks • Protective eyewear (goggles, face shield, or safety glasses).

USER SAFETY REQUIREMENTS

Discard clothing and other absorbent materials that have been drenched or heavily contaminated with this product's concentrate. **DO NOT** reuse them. Follow manufacturer's instructions for cleaning/maintaining PPE. If no such instructions for washables exist, use detergent and hot water. Keep and wash PPE separately from other laundry.

USER SAFETY RECOMMENDATIONS

Users should: • Remove clothing/PPE immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing. • Remove PPE immediately after handling this product. Wash the outside of gloves before removing. As soon as possible, wash thoroughly and change into clean clothing.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

DO NOT mix or allow coming in contact with oxidizing agent. Hazardous chemical reaction may occur.

EPA Reg. No. 45002-32-92564
EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the
batch number on this package. (65) = 92564-TX-1
(57) = 071106-GA-003 (42) = 88746-GA-01

BioAdvanced® is a registered trademark
of SBM Life Science Corp.

Distributed by:
SBM Life Science Corp.
1001 Winstead Drive,
Suite 500, Cary, NC 27513

501491815a 22033111

PRESS TO RESEAL

Product of China. Formulated in the US.