



3-IN-1 INSECT, DISEASE & PLANT MITE CONTROL

READY-TO-SPRAY II

FIRST AID

IF SWALLOWED

- Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.
- Have person sip a glass of water if able to swallow.
- Do not induce vomiting unless told to by a poison control center or doctor.
- Do not give anything to an unconscious person.

IF IN EYES

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

NOTE: Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.

For medical emergency information, you may call toll-free 1-877-229-3763.



ATTENTION: This product can expose you to myclobutanil which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION

- Harmful if swallowed.
- Causes moderate eye irritation.
- Avoid contact with eyes or clothing.
- Wear protective eyewear
- Wear long-sleeved shirt and long pants, socks and shoes
- Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.
- Remove and wash contaminated clothing before reuse

EPA Reg. No. 92564-83
EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.
(65) = 92564-TX-1
(46) = 88746-MO-1
(57) = 071106-GA-003

Distributed by: SBM Life Science Corp.
PO Box 525, Morrisville, NC 27560
BioAdvanced® is a registered trademark of SBM Life Science Corp.
501444966 230109V1

EPA Reg. No. 92564-83 EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package. (65) = 92564-TX-1 (57) = 071106-GA-003 (39) = 88888-MO-1 (68) = 88726-GA-1

PRESS TO RESEAL

501444966 230109V1

3 in 1 Formula - Insecticide, Fungicide, Miticide[^]

KILLS & PREVENTS



& OTHER LISTED PESTS

DISEASES CONTROLLED



& OTHER LISTED DISEASES

WHERE TO USE - OUTDOORS ON



For use on non-edible plants only

[†]Apply when pollinators are not present.

[^]Against plant mites

READ THE LABEL FIRST

Indicaciones en español después de las de inglés

QUESTIONS OR COMMENTS?
Text or call toll-free (877) 229-3724
or visit us online at www.bioadvanced.com



ATTENTION: This product can expose you to myclobutanol which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

^{††}Or your money back.

EPA Reg. No. 92564-83
Distributed by: SBM Life Science Corp., PO Box 525, Morrisville, NC 27560
BioAdvanced® is a registered trademark of SBM Life Science Corp.



PEEL
HERE

DIRECTIONS FOR USE It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Read and follow all label restrictions and directions when using this product.

BEFORE YOU APPLY

To protect pollinators when blooms are present, apply the product during early morning or late evening, when bees are not foraging. If applied prior to bloom, or blooms are removed or petal fall is complete, applications may be made during the day.

RESTRICTIONS:

- Do not make applications during rain.
- Avoid making applications when rainfall is expected before the product has sufficient time to dry (minimum 4 hours).
- Rainfall within 24 hours after application may cause unintended runoff of pesticide application.
- Do not apply when the wind speed is greater than 15 mph.
- Do not spray the product into fish pools, ponds, streams, or lakes.
- Do not apply directly to sewers or storm drains, or to any area like a drain or gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies, or aquatic habitat can occur.
- Do not allow the product to enter any drain during or after application.
- Do not apply directly to impervious horizontal surfaces such as sidewalks, driveways, and patios.
- Do not apply or irrigate to the point of runoff.
- Remove animal feeding dishes prior to application.
- Do not use in small, enclosed areas where spray may be inhaled.
- Do not apply to fruits or vegetables used for food.
- Do not use indoors - for houseplants, move them outside, treat, let dry and bring back indoors.
- For outdoor residential use only.
- Do not apply to areas which are waterlogged or saturated, which will not allow penetration into the root zone of the plant.
- Do not apply this product while bees are foraging.
- Do not treat or apply to lawns or turf.
- Do not apply more than 13 treatments per year. In Nassau and Suffolk Counties in New York State, do not apply more than 3 times per given area per year.
- Do not treat plants during periods of stress, i.e. heat, drought, flooding, insects, excessive fertilizer, herbicides or pesticide use, etc.
- Do not apply when temperatures are above 85°F.
- For application to individual plants only use conventional pump up sprayers at labeled rates.
- If disease is already present, this product will not eliminate it.

BEFORE YOU APPLY *con't*

- Not for use on plants being grown for sale or other commercial use, or for commercial seed production, or for research purposes. For use on plants intended only for aesthetic purposes or climatic modifications and being grown in interior plantscapes, ornamental gardens or parks, or lawn and grounds. Only use this product on plants being grown for aesthetic or climatic purposes and in interior and exterior sites, such as, gardens, parks, lawns, and grounds, and other ornamental sites. Do not use on vegetation intended for sale or other commercial uses. Do not use on plants grown for seed production or research purposes.
- Spot treatments must not exceed two square feet in size (for example, 2 ft. by 1 ft. or 4 ft. by 0.5 ft.).
- For foliar applications, do not apply by ground within 25 feet of lakes, reservoirs, rivers, permanent streams, marshes or natural ponds, estuaries and commercial fish farm ponds.

WHERE TO USE

Outdoors on rose bushes¹, flower plants¹, ground covers, vines, ornamentals, shrubs, and trees • Azaleas, Camellias, Rhododendrons and other shrubs¹ • Houseplants /container plants (treated outside) • For use on non-edible plants only.

¹Apply when pollinators are not present

WHEN TO USE

When insects*, plant mites, or disease* first appear.

- To avoid serious damage, treat pests and diseases early in the season before they multiply.

HOW OFTEN

Kills insects* on contact and keeps on killing for up to 14 days. For control of Japanese beetles, plant mites, severe infestations of other pests* and diseases:
Repeat every 14 days as necessary.

*listed

HOW IT WORKS

This product provides 3-way action: kills existing pests, forms protective barrier on outside of plant and is absorbed into the plant regardless of weather conditions. This product provides 3-way action: kills insects* on contact, controls plant mites, and controls diseases*, and keeps on protecting for up to 2 weeks. The maximum application rate for Bifenthrin is 0.114 lbs ai/A. The maximum application rate for Myclobutanil is 0.106 lbs ai/A.

*listed

HOW TO USE

Shake well before using. This product is ready to spray. Just attach this bottle to your hose according to directions. Water automatically mixes with the concentrate as you spray.

For first time use, remove plastic shipping lock.

CONNECT

1. Shake well before use.
2. Connect sprayer to garden hose.
3. Make sure that the Sprayer is in the OFF position.
4. Turn on water at faucet.



SPRAY

1. Extend hose to farthest area to be treated, point Sprayer nozzle in direction to be sprayed.
2. Turn Sprayer to ON position.
3. Walk at a steady pace while spraying, using an even sweeping motion, and slightly overlap treated areas.

Work back toward faucet to avoid walking over wet, treated areas.

FINISH

1. To stop spraying, turn Sprayer to OFF position.
2. Turn off water at faucet.
3. Relieve water pressure in hose by turning Sprayer to ON position until water slows to a drip, then turn Sprayer to OFF position.
4. Disconnect Sprayer from hose.

INSECTS AND MITES CONTROLLED

Adelgids+
Ants- including pavement ants,
acrobat ant, big headed ant,
crazy ant, corn field ant, odorous
house ant, little black ant, leaf
cutter ants
~(excluding fire,
harvester, pharaoh, and
carpenter ants)
Aphids
Armyworms
Bagworms
Beetles+
Boxelder bugs
Budworms
Brown soft scales
Cankerworms
Caterpillars
Chinch bugs
Crickets
Cucumber beetles
Cutworms
Diaprepes (adult)
Earwigs
Elm leaf beetles
Fall webworms
Firebrats
Flea beetles
Fungus gnats (adult)
Grasshoppers
Gypsy (spongy) moth larvae
Japanese beetles (adult)+
Lace bugs
Leaf-feeding beetles
Leaf-feeding caterpillars
Leafhoppers
Leafminers (including Birch
Leafminers and Holly Leafminers)
Leafrollers
Loopers
Mealybugs
Millipedes
Pillbugs
Pine shoot beetle (adult)
Plant bugs
Plant Mites (including broad mites,
clover mites, European red mites,
pecan leaf scorch mite)
Psyllids+
Rose Midges
Rose Slugs
Sawflies
Scale insects (crawler stages including
California red scale, pine needle
scale, San Jose scale)
Silverfish
Sowbugs
Spiders (excluding black widow, hobo
and brown recluse)
Spider mites
Spittlebugs+
Stink bugs
Tarnished plant bugs
Tent caterpillars
Thrips (including citrus
thrips)
Tip moths
Treehoppers+
Twig borers
Viburnum leaf beetle
Webworms
Weevils including adult root weevils,
black vine weevil, orchard weevil
Whiteflies

+ Not for use in California

CONTROLS LISTED DISEASES

Black Spot	Rust	Leaf Spot	Petal Blight
Powdery Mildew	Scab	Anthracnose	

RESTRICTIONS

Do not apply this product while bees are foraging. Do not wet the foliage within four hours after applying.

APPLICATION INSTRUCTIONS

Apply until both sides of the leaves are evenly coated with spray, but not dripping, at a rate of 6.9 fl oz per 1,000 sq. ft. One 32 fl. oz bottle of ready-to-spray product should cover 4,618 sq. ft, or approximately 170 rose bushes† (each 5 ft by 5 ft).
To treat existing disease: apply at least 3 times, every 14 days apart beginning at the first sign of disease.

To prevent diseases: apply at least 3 times, every 14 days apart during the growing season, starting when new leaves first appear.

† Apply when pollinators are not present

FOR BEST RESULTS

To avoid serious damage to plants, treat pests early in the season before they multiply. For optimum bagworm control, treat when larvae have started to hatch, directing spray to contact as many larvae as possible.



People & pets may enter the area after the spray has dried.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate food, water, or feed by storage or disposal.

PESTICIDE STORAGE

Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably a locked storage cabinet.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING

If Empty:

Non-refillable container. Do not refill or reuse container. Place empty container in trash or offer for recycling if available.

If Partly Filled:

- Call your local solid waste agency for disposal instructions.
- Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

NOTICE: Research and testing have determined that the "Directions for Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. To the extent consistent with applicable law, the Buyer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions.

Money Back Guarantee: If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

FIRST AID

IF SWALLOWED

- Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.
- Have person sip a glass of water if able to swallow.
- Do not induce vomiting unless told to by a poison control center or doctor.
- Do not give anything to an unconscious person.

IF IN EYES

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

NOTE: Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. **For medical emergency information, you may call toll-free 1-877-229-3763.**



ATTENTION: This product can expose you to myclobutanil which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION

- Harmful if swallowed.
- Causes moderate eye irritation.
- Avoid contact with eyes or clothing.
- Wear protective eyewear
- Wear long-sleeved shirt and long pants, socks and shoes
- Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.
- Remove and wash contaminated clothing before reuse

ENVIRONMENTAL HAZARDS

- This product is toxic to fish and aquatic organisms.
- Do not apply directly to water or to areas where surface water is present or to intertidal areas below the mean high-water mark.
- To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters, or surface waters.
- Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.
- Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.
- Apply this product only as specified on this label.
- Care should be used when spraying to avoid fish and reptile pets in/around ornamental ponds.
- This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow to drift to blooming plants if bees are foraging in the treatment area.

INSTRUCCIONES DE USO Constituye una violación a la ley federal usar este producto de manera diferente a lo establecido en esta etiqueta.

Lea y siga las instrucciones y restricciones en la etiqueta cuando use este producto.

ANTES DE APLICARLO

Para proteger a los polinizadores cuando las floraciones están presentes, aplicar el producto a la mañana temprano o la tardecita, cuando las abejas están buscando alimento. Si se aplica cuando se produce la floración, o se quita la floración o se caen todos los pétalos, las aplicaciones pueden hacerse durante el día.

RESTRICCIONES:

- No realizar aplicaciones si llueve.
- Evitar hacer aplicaciones cuando se esperan lluvias antes de que el producto haya tenido. Lea y siga las instrucciones y restricciones en la etiqueta cuando use este producto.
- La lluvia dentro de las 24 horas luego de la aplicación puede hacer que el pesticida corra.
- No aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor a 15 mph.
- No rociar el producto en lagunas con peces, pozos, arroyos o lagos.
- No aplicar directamente sobre drenajes o alcantarillas, o cualquier área como una cuneta donde el agua pueda drenar hacia las alcantarillas de lluvia, cuerpos de agua o hábitats acuáticos.
- No permitir que el producto ingrese en algún drenaje durante o después de la aplicación.
- No aplicar directamente a superficies horizontales impenetrables tales como aceras, caminos y patios.
- No aplicar o regar el área tratada hasta el punto que corra el agua.
- Quitar los recipientes para alimentación de animales antes de su aplicación.
- No aplicar en frutas o vegetales que se usan como alimento.
- No usar en áreas pequeñas, cerradas donde se puede inhalar el rocío.
- No usar en interiores, en caso de plantas de interiores sacarlas al exterior para tratarlas, dejarlas secar y llevarlas nuevamente dentro de la casa.
- Para uso residencial en exteriores solamente.
- No aplicar en suelos que estén inundados o saturados con agua, que no permitirán la penetración en la zona de las raíces de la planta.
- No aplicar o tratar el césped o pasto.
- No aplicar este producto mientras las abejas están buscando alimento.

ANTES DE APLICARLO *con't*

- No aplicar más de 13 veces al año. En los condados de Nassau y Suffolk en el estado de New York, no aplicar más de 3 veces por área tratada por año.
- No tratar a las plantas durante periodos de estrés, es decir, calor, sequía o inundación, insectos, fertilizador en exceso, uso de herbicidas o pesticidas, etc.
- No aplicar cuando las temperaturas estén por encima de los 85°F.
- Si la enfermedad está presente, este producto la eliminará.
- Para aplicación en plantas individuales solo use rociadores convencionales de bomba según la tasa que aparece en la etiqueta.
- No se debe usar en plantas que se cultivan para la producción comercial de semillas o con fines de investigación. Para uso en plantas con fines estéticos solamente o modificaciones climáticas y que crecen en espacios interiores, jardines ornamentales o parques, suelos y céspedes. Solo use este producto en plantas que se cultivan con fines estéticos o con fines climáticos, y en espacios interiores y exteriores tales como jardines, patios, y suelos, y en otros lugares decorativos. No usar en vegetación que va a ser usada para la venta u otros usos comerciales. No usar en plantas que se usan para la comercialización u otros fines de investigación.
- No aplicar a plantas que se cultivan para la producción de semilla o con fines de investigación. Los tratamientos localizados no deben ser mayores a dos pies cuadrados de tamaño (por ejemplo, 2 pies).
- Para aplicaciones en hojas, no aplicar en el suelo dentro de 25 pies de lagos, reservas, ríos, arroyos permanentes, pantanos o lagunas naturales, estuarios y lagunas comerciales.

DÓNDE USAR

En espacios exteriores en rosas ¹, plantas con flores¹, plantas rastreras, vides, ornamentales, arbustos y árboles • Azaleas, camelias, rododendros y otros arbustos¹

- Plantas de interiores/macetas plantas de interior (hacer el tratamiento afuera)
- Para uso en plantas no comestibles solamente.

¹Aplicar cuando los polinizadores no están presentes

CUÁNDO USAR

Cuando los insectos*, hongos o enfermedades* aparecen por primera vez.

- Para evitar daño grave, tratar plagas y enfermedades a comienzos de la temporada antes de que se multipliquen.

*de la lista

FRECUENCIA

Mata los insectos* de la lista por contacto y sigue matando durante hasta 14 días. Controla el escarabajo japonés, los hongos en las plantas, infestaciones graves* de otras plantas y enfermedades*. Repetir cada 14 días según sea necesario.

CÓMO FUNCIONA

Este producto brinda acción en 3 modos: mata las plagas actuales, forma una barrera de protección en la parte externa de la planta y se absorbe en la planta independientemente de las condiciones climáticas. Este producto brinda acción en 3 modos: mata los insectos* por contacto, controla los hongos y controla enfermedades* y sigue protegiendo durante hasta 2 semanas. La tasa máxima de aplicación de Bifenthrin es 0.114 libras ai/A. La tasa de aplicación máxima de Myclobutanil es 0.106 lbs ai/A.

CÓMO USAR

Agitar bien antes de usar. Este producto está listo para rociar. Solo coloque esta botella en su manguera de acuerdo a las indicaciones. El agua se mezcla automáticamente con el concentrado a medida que usted rocía.

Cuando se use por primera vez, quitar el bloqueo de plástico de envío.

CONECTAR

1. Agitar bien antes de usar.
2. Conectar el rociador de manera segura a la manguera del jardín.
3. Asegúrese que el Rociador esté en posición cerrado OFF.
4. Abrir el grifo de agua.



ROCIAR

1. Extender la manguera hasta el área más lejana, apuntar la boquilla del rociador en dirección hacia donde desea rociar.
 2. Girar el rociador a la posición ON.
 3. Caminar a un ritmo constante mientras rocía, usando un movimiento oscilante y volver a regar la misma área tratada solo un poco.
- Caminar hacia atrás hacia el grifo para evitar caminar sobre el césped húmedo y tratado.

*de la lista

TERMINAR

1. Para finalizar el rocío, llevar el rociador hasta la posición OFF.
2. Apagar el grifo de agua.
3. Liberar la presión de agua en la manguera girando la válvula del rociador nuevamente a la posición ON hasta que el agua disminuya lentamente a un goteo, luego volver a girar la válvula del rociador a la posición OFF.
4. Desconectar el rociador de la manguera.

INSECTOS y HONGOS CONTROLADOS

Adélgidos+	Saltamontes
Hormigas ~ , incluye hormiga del pavimento, hormiga acróbata, hormiga de cabeza grande, hormiga loca, hormiga del maizal, hormiga doméstica olorosa, hormiga negra chiquita, hormiga cortadora de hojas	Larvas de polillas gitanas (esponjosas)
~(No incluye, las hormigas de fuego, faraonas, carpinteras, y cosechadoras)	Escarabajos japoneses (adulto)
Pulgones	Escarabajos de encaje
Gusanos militares	Escarabajos come hojas
Gusanos del saco	Orugas come hojas
Escarabajos+	Chicharritas
Insecto del árbol Boxelder	Moscas minadoras (incluyendo las moscas minadoras del abedul y del acebo)
Gusanos	Enrolladores de hojas
Cascarilla marrón	Orugas
Gusanos pulgadas	Cochinillas
Orugas	Diplopoda
Chinches	Chinches
Grillos	Escarabajo del brote del pino (adulto)
Escarabajos verdes	Insectos de plantas
Gusanos cortadores	Hongos de las plantas (incluye la araña blanca, ácaros del trébol, ácaros rojos europeos, ácaro de la hoja negra)
Diaprepes (adulto)	Psílicos+
Tijerilla	Mosquillas de la rosa
Escarabajos de la hoja del olmo	Larvas de las rosas
Hyphantria cunea	Moscas de sierra
Insectos de fuego	Larvas de las rosas
Escarabajos perforadores de las hojas	Moscas de sierra
Mosquitas de los hongos (adultas)	Insectos escama (en estado de larva, incluye la mosquilla roja de California, la mosquilla de la aguja del pino y las escamas de San José)
	Lepismas

+ No puede usarse en California

INSECTOS y HONGOS CONTROLADOS con't

Cochinillas de la humedad	Barrenador de los brotes
Arañas (excepto la viuda negra hobo y la reclusa negra)	Saltamontes+
Ácaro de las piceas	Barrenador tijerilla
Cigarras espumadoras+	Escarabajos del Viburnum
Chinches	Gusanos telerañeros
Chinche opaca de las plantas	Gorgojos incluyendo gorgojo adulto de la raíz, picudos negros de la vid, gorgojo de la huerta
Orugas de la carpa	Mosquilla blanca
Trips (incluye trips de los cítricos)	

CONTROLA LAS ENFERMEDADES DE LA LISTA

Mancha negra	Mancha de la hoja	Tizón polvoriento	Antracnosis
Mancha foliar	Tizón foliar	Roña	

RESTRICCIONES

No aplicar este producto mientras las abejas están buscando alimento.
No humedecer las hojas dentro de una hora luego de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicar en ambos lados de las hojas de manera pareja y cubrir con rocío, pero que no gotee, en una proporción de 3 onzas líquidas por cada 1,000 pies cuadrados. Una botella de 32 onzas líquidas del producto listo para rociar debería cubrir 4,618 pies cuadrados o aproximadamente 170 arbustos de rosas¹ (cada 5 pies por 5 pies). Para tratar una enfermedad existente: aplicar como mínimo 3 veces, cada 7-14 días comenzando desde el primer signo de enfermedad. Para prevenir enfermedades: aplicar como mínimo 3 veces, cada 14 días durante la temporada de crecimiento, comenzando cuando aparecen las hojas nuevas.

+ No puede usarse en California

¹Aplicar cuando los polinizadores no están presentes

PARA MEJORES RESULTADOS

Para evitar daño grave, tratar las plagas a comienzos de la temporada antes de que se multipliquen. Para un óptimo control de las orugas, aplicar el tratamiento cuando la larva ha comenzado a nacer, dirija el rocío para que entre en contacto con tantas larvas como sea posible.



Las personas y las mascotas pueden ingresar al área luego de que el rocío se haya secado.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contaminar alimentos, agua o alimentaciones por almacenamiento o eliminación.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA

Almacene en el contenedor original en un lugar seco y fresco, fuera del alcance de los niños, preferentemente en un gabinete de almacenamiento cerrado.

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL CONTENEDOR

Si está vacío:

Contenedor no rellenable. No rellenar o volver a usar el contenedor. Colocar el contenedor vacío en la basura para su reciclado si fuese posible.

Si está parcialmente lleno:

- Llamar a la agencia de eliminación de desechos sólidos para conocer las indicaciones de eliminación.
- Nunca colocar el producto sin usar en un drenaje de salida o de entrada.

AVISO: Las investigaciones y pruebas han determinado que las "Indicaciones de uso" corresponden al uso adecuado de este producto en condiciones esperadas. Hasta el punto en que aplica la ley, el comprador asume la responsabilidad de falta de rendimiento o seguridad si no se usa de acuerdo a las instrucciones.

Garantizamos la devolución del dinero: Si no está satisfecho con este producto, le devolveremos el dinero de la compra original.

PRIMEROS AUXILIOS

SI LO TRAGA

- Hacer que la persona sorba un vaso de agua si puede tragar.
- Llamar al centro de control de envenenamiento o al médico inmediatamente para asesoramiento sobre el tratamiento.
- No inducir el vómito a menos que lo indique un médico o el centro de control de envenenamiento.
- No dé nada a una persona inconsciente.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS

- Mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente y cuidadosamente con agua durante 15 o 20 minutos.
- Quitar los lentes de contacto, si los tuviera, luego de los primeros 5 minutos, continuar lavando los ojos
- Llamar al centro de control de envenenamiento o al médico para asesoramiento sobre el tratamiento.

NOTA: Tenga el contenedor o la etiqueta del producto con usted cuando llame al centro de control de envenenamiento o al médico, o cuando vaya para recibir tratamiento. **En caso de información de emergencia, puede llamar al 1-877-229-3763.**



Atención: Este producto puede exponerlo al miclobutanil un químico conocido en el estado de California porque causa cáncer, defectos de nacimiento u otro daño reproductivo. Para más información, ingrese en www.P65Warnings.ca.gov. <http://www.P65Warnings.ca.gov/>

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Peligroso para animales domésticos y humanos

PRECAUCIÓN

- Peligroso si lo traga.
- Causa irritación moderada en los ojos.
- Usar anteojos de protección.
- Evitar contacto con los ojos o ropa.
- Usar camisa mangas largas, pantalones largos, zapatos y calcetines.
- Lavar las manos cuidadosamente con agua y jabón luego de manipularlo, antes de comer, beber, masticar goma de mascar, usar tabaco o ir al baño.
- Quitar y lavar la ropa contaminada antes de volver a usar.

PELIGROS AMBIENTALES

- Este producto es tóxico para los organismos acuáticos y peces.
- No aplicar directamente en el agua o en áreas donde hay agua superficial presente o en áreas cercanas por debajo de la marca de agua media.
- Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida ingrese o se escurra por las bocas de tormenta, zanjas, alcantarillas o aguas superficiales.
- Aplicar este producto cuando el clima esté calmo y no haya probabilidad de lluvia para las siguientes 24 horas ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida fuera del área de tratamiento.
- Enjuagar el equipo usado para la aplicación en el área tratada ayudará a evitar que el producto ingrese en cuerpos de agua o sistemas de drenaje.
- Aplicar este producto solamente tal como se especifica en esta etiqueta.
- Se debe ser cuidadoso al aplicar este producto en o alrededor de los peces o reptiles en lagunas decorativas.
- Este producto es altamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo o residuos en plantas con flores o malezas. No aplicar este producto o permitir que se escurra/entre en contacto con plantas con flores si las abejas buscan alimento en el área de tratamiento.